

# Helix® Saltro® Fortenza® Advanced

syngenta.

GROUPS	3	4	7	12	FONGICIDES
GROUPS	4	4C	28	INSECTICIDES	

Do not use for food, feed or oil processing. This seed has been treated with the insecticide, thiamethoxam, insecticides cyantraniliprole and sulfoxaflor, and the fungicides, difenoconazole, metalaxyl-M and S-isomer, fludioxonil, sedaxane and pydiflumetofen. Store this product away from food or feed. Keep treated seeds out of reach of children and animals. During handling and planting treated seeds and during maintenance, clean-up and repair, wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and work boots. Wear a NIOSH-approved N95 (minimum) filtering facepiece respirator (dust mask) that is properly fit tested when handling treated seeds, including transferring treated seed to the planter/seeder, loading and unloading. Use only closed-cab planting equipment. Gloves and a dust mask do not need to be worn when inside the closed cab. Treated seed is TOXIC to birds. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface. Toxic to small wild mammals. Toxic to bees. Follow best management practices to help minimize dust exposure to pollinators during planting of treated seed; refer to the complete guidance "Pollinator Protection: reducing risk from treated seed" on the Health Canada website ([www.canada.ca/pollinators](http://www.canada.ca/pollinators)).


**CAUTION - EYE IRRITANT**  
**WARNING - CONTAINS THE ALLERGEN SOY**



HELIX®, SALTRO®, FORTENZA®, RASCENDO®, the Alliance Frame the Syngenta logo and the Purpose Icon are trademarks of a Syngenta Group Company.



FOM-17921



English size 3 1/2 x 7

# Helix® Saltro® Fortenza® Advanced

syngenta.

GROUPES	3	4	7	12	FONGICIDES
GROUPES	4	4C	28	INSECTICIDES	

Ne pas utiliser pour l'alimentation humaine ou animale ou pour l'extraction d'huile. Ces semences ont été traitées avec les insecticides thiaméthoxame, cyantraniliprole sulfoxaflor, et les fongicides difénoconazole, métalaxyl-M et isomère-S, fludioxonil, sédaxane et pydiflumétoféne. Conserver à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Garder les semences traitées hors de la portée des enfants et des animaux. Lors de la manipulation et l'ensemencement des semences traitées et pendant l'entretien, le nettoyage et la réparation de l'équipement, porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des des bottes de travail. Porter un respirateur à masque filtrant N95 (minimum) approuvé par le NIOSH (masque antipoussière) qui est correctement ajusté pour manipuler les semences traitées, lors du transfert des semences traitées au semoir, le chargement et le déchargement. N'utiliser que de l'équipement avec cabine fermée pour le semis. Le port de gants et d'un masque antipoussières n'est pas requis à l'intérieur d'une cabine fermée au moment du semis. Les semences traitées sont TOXIQUES pour les oiseaux et les petits animaux sauvages. Toutes les semences traitées qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être ramassées ou enfouies dans le sol. Ce produit est toxique pour les abeilles. Suivez les pratiques exemplaires de gestion pour aider à minimiser l'exposition aux poussières de pollinisateurs lors de la plantation de semences traitées. Consultez le guide intitulé "Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des semences traitées - Pratiques exemplaires de gestion affiché sur le site Web de Santé Canada ([www.canada.ca/pollinisateurs](http://www.canada.ca/pollinisateurs)).

**CAUTION - IRRITANT POUR LES YEUX**  
**AVERTISSEMENT CONTIENT L'ALLERGÈNE SOYA**



HELIX®, SALTRO®, FORTENZA®, RASCENDO®, le symbole de l'Alliance le logo Syngenta et le symbole du But sont des marques de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.



FOM-17921



French size 3 1/2 x 7