Helix® Saltro®

syngenta®

GROUPS	3	4	7	12	FUNGICIDES
GROUP		4			INSECTICIDE

Do not use for food, feed or oil processing. This seed has been treated with the insecticide, thiamethoxam and fungicides, difenoconazole, metalaxyl-M and S-isomer, fludioxonil, sedaxane and pydiflumetofen. Store this product away from food or feed. Keep treated seeds out of reach of children and animals. During handling and planting treated seeds and during maintenance, clean-up and repair, wear coveralls over a long-sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes. Wear a NIOSH-approved N95 (minimum) filtering facepiece respirator (dust mask) that is properly fit tested when handling treated seeds, including transferring treated seed to the planter/seeder, loading and unloading. Use only closed-cab planting equipment. Gloves and a dust mask do not need to be worn when inside the closed cab. Treated seed is TOXIC to birds. Toxic to small wild mammals. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.

FOM-17920

Helix®, Saltro®, the Alliance Frame, the Syngenta logo and the Purpose Icon are trademarks of a Syngenta Group Company.

568 C | 464 C | 344 C | 463 C | BLACK

English size 3 1/2 x 7

Helix® Saltro®

syngenta®

GROUPES	3	4	7	12	FONGICIDES
GROUPE		4			INSECTICIDE

Ne pas utiliser pour l'alimentation humaine ou animale ou pour l'extraction d'huile. Ces semences ont été traitées avec l'insecticide thiaméthoxame et les fongicides difénoconazole, métalaxyl-M et isomère-S, fludioxonil, sédaxane et pydiflumétofène. Conserver à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. Garder les semences traitées hors de la portée des enfants et des animaux. Lors de la manipulation et l'ensemencement des semences traitées et pendant l'entretien, le nettoyage et la réparation de l'équipement, porter une combinaison par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures. Porter un respirateur à masque filtrant N95 (minimum) approuvé par le NIOSH (masque antipoussière) qui est correctement ajusté pour manipuler les semences traitées, lors du transfert des semences traitées au semoir, le chargement et le déchargement. N'utiliser que de l'équipement avec cabine fermée pour le semis. Le port de gants et d'un masque antipoussières n'est pas requis à l'intérieur d'une cabine fermée au moment du semis. Les semences traitées sont TOXIQUES pour les oiseaux. Toxique pour les oiseaux et les petits animaux sauvages. Toutes les semences traitées qui sont renversées ou à la vue sur le sol doivent être ramassées ou enfouies dans le sol.

FOM-17920

Helix®, Saltro®, le symbole de l'Alliance, le logo Syngenta et le symbole du But sont des marques de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.

568 C | 464 C | 344 C | 463 C | BLACK

French size 3 1/2 x 7